



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dezynfekcja - Dezynfekcja powierzchni przez wycieranie

Wetrok SintoClean HN

Bezaldehydowy, dezynfekujący środek czyszczący o szerokim spektrum działania do powierzchni odpornych na alkalia





Wetrol SintoClean HN



Wartość pH (koncentrat): 12.5–13.5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne, Biocyd,
Rozpuszczalnik

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- Środek dezynfekujący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
- do dezynfekcji zmywalnych, odpornych na alkalia powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.)
- do stosowania w sektorze zdrowia publicznego oraz w sektorze żywności i pasz (bez bezpośredniego przetwarzania żywności)

WŁAŚCIWOŚCI

- działanie bakteriobójcze (w tym salmonella)
- działanie grzybobójcze (*C. albicans*, *A. brasiliensis*)
- działanie wirusobójcze (w tym norowirus i rotawirus)
- zasadowy, słabo pieniający
- nieperfumowany

WARTO WIEDZIEĆ

- do rutynowej dezynfekcji powierzchni zaleca się stosowanie roztworu 2% o czasie ekspozycji 5 minut (unieszkodliwianie bakterii, drożdżaków i wirusów otoczkowych)
- po upływie zalecanego czasu kontaktu zdezynfekowane powierzchnie wchodzące w kontakt z żywnością kilkakrotnie dokładnie spłukać bieżącą wodą o jakości wody pitnej

UWAGA

- stosować tylko do gładkich (niechłonnych/nieporowatych) materiałów
- nie stosować bezpośrednio do żywności
- nie skracać czasu ekspozycji i przestrzegać specjalnych czasów ekspozycji

ZALECANE METODY UŻYCIA

Dezynfekcja powierzchni środkiem czyszcząco-dezynfekującym

Suchą powierzchnię zdezynfekować w jednym cyklu roboczym mokrym lub lekko wyciśniętym mopem. Nanieść środek dezynfekcyjny w odpowiedniej ilości. Powierzchnia musi być całkowicie pokryta środkiem. Przestrzegać czasu ekspozycji. Nosić rękawiczki.

DOZOWANIE I CZAS EKSPOZYCJI

Skuteczność	Metoda testowania	Dozowanie (%)	Czas ekspozycji
działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze	EN 13624	2	5 min
	EN 13697		
	EN 13727		
	EN 16615		
działanie grzybobójcze	EN 13624	4	60 min
	EN 16615		
ograniczone działanie wirusobójcze	EN 14476	3	5 min
	EN 16777		
Norowirus	EN 14476	5	30 min
	EN 16777		
działanie wirusobójcze	EN 14476	5	60 min
	EN 16777		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości przed otwarciem patrz etykieta produktu.

Wetrol AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać



Wetrok SintoClean HN

specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.