



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dezynfekcja - Dezynfekcja powierzchni przez wycieranie

Wetrok SintOx 15%

Dezynfekcja nadtlenkiem wodoru dla bardziej ekologicznego zastosowania - skuteczna wobec bakterii, drożdżaków, pleśni, wirusów otoczkowych i bezotoczkowych





Wetrok SintOx 15%



Wartość pH (koncentrat): 0.7–1.7

Główne składniki:

Nadtlenek wodoru 7,5g/100g

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- Środek do dezynfekcji powierzchni, na bazie nadtlenu wodoru/związków srebra
- Zakres zastosowań: placówki służby zdrowia i weterynarii, zakłady przetwórstwa żywności i pasz
- Nadaje się do dezynfekcji wody pitnej, środek ochronny w systemach chłodniczych i procesowych (tylko CH)

WŁAŚCIWOŚCI

- działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze
- działanie grzybobójcze (drożdżaki i pleśń)
- działanie wirusobójcze (wirus polio, adenowirus, norowirus)
- przeciwko wirusom otoczkowym i bezotoczkowym
- nie wymaga spłukiwania

WARTO WIEDZIEĆ

- działa całkowicie po 30 minutach ekspozycji przeciw bakteriom, wirusom, drożdżakom i pleśni

UWAGA

- Może przebarwić mosiądz
- regularne stosowanie może naruszyć powłoki z dyspersji samonabylszczających
- w przypadku powłok lakierowych oraz materiałów tapicerskich zaleca się przetestowanie działania produktu w niewidocznym miejscu
- w przypadku tworzenia się kałuż wytrzeć po upływie czasu ekspozycji

ZALECANE METODY UŻYCIA

Dezynfekcja powierzchni

Wyczyszczoną i suchą powierzchnię zdezynfekować mokrym lub lekko wyciśniętym mopem, wywierać przy tym lekki nacisk. Nanieść środek dezynfekcyjny w odpowiedniej ilości. Powierzchnia musi być całkowicie pokryta środkiem. Przestrzegać czasu ekspozycji. Nosić rękawiczki.

DOZOWANIE I CZAS EKSPOZYCJI

Skuteczność	Metoda testowania	Dozowanie (%)	Czas ekspozycji
działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze	EN 13697, duże obciążenie	40	30 min
		66	15 min
działanie grzybobójcze	EN 1650, małe obciążenie	50	15 min
działanie wirusobójcze	EN 14476	66	30 min
Norowirus	EN 14476	66	15 min
	EN 16777	66	30 min
Adenowirus	EN 14476	66	15 min
	EN 16777	66	30 min

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości przed otwarciem patrz etykieta produktu.

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.